

## 成人看護学②

# 健康危機状況／セルフケアの再獲得



ムービータイトル	サムネイル	サマリー	教科書該当箇所
患者のための図書館 (5分5秒) ()		開院当初から病院図書室をもっている病院の図書システムを紹介。当初は医学書中心だったが、次第に患者向けの蔵書も増やし、患者も治療に参加する意識を向上させようとする取り組みを行っている。	1 章 健康危機状況にある成人の理解と看護 ■ 2 健康危機状況にある成人に生じるセルフケア不足 3 身体機能悪化の予防と早期発見
手術室看護 (1分45秒) ()		クモ膜下出血で救命救急センターに搬送され、緊急手術を受けることになった患者に対する、手術室看護の一例を紹介。	1 章 健康危機状況にある成人の理解と看護 ■ 3 代表的な健康危機状況と看護の特徴 2 手術等の侵襲的治療を予定して受ける状況
救命救急治療を必要とする状況 (4分10秒) ()		患者搬送の連絡から、受け入れ準備、救命救急センターへの搬送、診察から救急治療の流れについて紹介する。	1 章 健康危機状況にある成人の理解と看護 ■ 3 代表的な健康危機状況と看護の特徴 3 救命救急治療を必要とする状況
手術後観察：前半 (10分14秒) ()		ルート類を装着している患者の、初回排尿後に帰室するまでと、帰室して臥床するまでの流れについて紹介し、それぞれの看護場面について解説する。	3 章 健康危機状況にある患者の看護 ■ 1 病棟入院患者 左腎管腫瘍手術により健康危機状況にある自営業の男性 1 病棟入院患者の健康危機状況
手術後観察：後半 (20分15秒) ()		胃切開術を受けた患者に対する看護について、前半部分では術後観察の一連の流れを提示し、後半部分においては、各観察内容について、それぞれ解説する。	3 章 健康危機状況にある患者の看護 ■ 1 病棟入院患者 左腎管腫瘍手術により健康危機状況にある自営業の男性 1 病棟入院患者の健康危機状況
セルフケア再獲得モデル (7分16秒) ()		セルフケア再獲得モデルは、生命維持レベルのセルフケア、生活基本行動レベルのセルフケア、社会生活レベルのセルフケアの3つの異なる次元のセルフケアの存在をもとに分類したものである。	4 章 セルフケアの低下状態にある成人の理解 ■ 1 成人にとってのセルフケア再獲得 セルフケアの低下した大人の理解と看護の視座 5 セルフケア再獲得モデル
透析患者の一例 (7分55秒) ()		兵庫県在住の遺伝性腎疾患による人工透析患者に密着。ライフスタイルや治療についてのとらえかたなどを紹介する。	4 章 セルフケアの低下状態にある成人の理解 ■ 2 セルフケアの低下と再獲得 1 生命維持レベルのセルフケアの低下と再獲得

# 健康危機状況／セルフケアの再獲得

ムービータイトル	サムネイル	サマリー	教科書該当箇所
創傷・オストミー・失禁 (WOC) 看護認定看護師 (6分59秒) ()		大阪府岸和田市の公立病院に勤務するWOC 看護認定看護師を例に、患者指導や教育、ケアなどの日常業務について紹介する。	4章 セルフケアの低下状態にある成人の理解 ■ 2 セルフケアの低下と再獲得 2 生活基本行動レベルのセルフケアの低下と再獲得
依存による自立 (9分40秒) ()		交通事故により車椅子生活となった事例をもとに、地域の中で独立した生活を送っている様子を紹介する。	4章 セルフケアの低下状態にある成人の理解 ■ 3 セルフケアの再獲得と自立 3 依存による自立
脳梗塞患者の看護 (失語症) (2分35秒) ()		脳梗塞患者とのコミュニケーションのとりかたの例を提示し、看護のポイントを紹介する。	5章 セルフケア再獲得を必要とする成人への看護 ■ 1 セルフケア低下状態のアセスメントと評価 3 アセスメントの内容と方法
関節可動域訓練 (ROM訓練) (6分35秒) ()		ROM 訓練は、固縮した関節運動の改善や拘縮予防のために行われる。無理な運動をして脱臼や骨折を引き起こさないように注意することが大切である。	5章 セルフケア再獲得を必要とする成人への看護 ■ 2 セルフケア再獲得を支援する看護方法 1 生命維持レベルのセルフケア再獲得への支援
食事動作 (3分10秒) ()		片麻痺患者の食事動作の介助の実際や有用な介助具などを紹介する。	5章 セルフケア再獲得を必要とする成人への看護 ■ 2 セルフケア再獲得を支援する看護方法 2 生活基本行動レベルのセルフケア再獲得への支援
右麻痺患者の ADL 支援 (8分40秒) ()		車椅子移動段階にある脳卒中右片麻痺患者を想定し、起床してから、排泄をし、更衣にいたるまでの動作に対する支援を解説する。	5章 セルフケア再獲得を必要とする成人への看護 ■ 2 セルフケア再獲得を支援する看護方法 2 生活基本行動レベルのセルフケア再獲得への支援
脊髄（頸髄）損傷患者 の更衣 (8分10秒) ()		45歳男性の頸髄損傷患者（C6 損傷）をモデルとして、更衣の介助の実際を紹介する。	5章 セルフケア再獲得を必要とする成人への看護 ■ 2 セルフケア再獲得を支援する看護方法 2 生活基本行動レベルのセルフケア再獲得への支援

## 健康危機状況／セルフケアの再獲得

ムービータイトル	サムネイル	サマリー	教科書該当箇所
脳卒中急性期にある人の看護 (8分) 		茨城県の大学附属病院の急性期看護の一例を紹介する。ここでは脳卒中急性期の患者に対する看護について取り上げる。	6章 セルフケア再獲得を目指す成人への看護の実際 ■ 1 生命維持レベルのセルフケアの再獲得 脳出血急性期にある人の看護 2 脳出血急性期における看護
脳卒中回復期にある人の看護 (4分25秒) 		脳卒中回復期にある患者への看護について、リハビリテーションチームとの連携やセルフケア再獲得に向けた関わりを提示する。	6章 セルフケア再獲得を目指す成人への看護の実際 ■ 2 生活基本行動レベルのセルフケアの再獲得 脳出血回復期にある人の看護 1 脳出血の回復期の病態・治療・看護
脳卒中家庭復帰期にある人の看護 (8分25秒) 		社会生活レベルのセルフケア再獲得段階である脳卒中家庭復帰期の患者とその家族へのサポートを紹介する。	6章 セルフケア再獲得を目指す成人への看護の実際 ■ 3 家庭におけるセルフケアの再獲得 脳出血家庭復帰期にある人の看護 1 脳出血の家庭復帰期における治療と看護